

Kontraindikace Polária

Absolutní kontraindikace Polária

- akutní onemocnění srdce a oběhu (infarkt myokardu, instabilní angina pectoris, plicní embolie, myokarditidy) v posledních 6 měsících
- dekompenzovaná hypertenze (TK dlouhodobě nad 150/95)
- porucha arteriálního prokrvení III. a IV. stadia (arteritis obliterans)
- alergie na chlad
- nádorová onemocnění
- záněty hlubokého žilního systému
- stavy po periferních emboliích
- terminální /konečná/ stadia onemocnění srdce, plic a ledvin
- horečnaté infekční onemocnění
- hnisavě-gangrenózní léze na dolních končetinách většího rozsahu
- těžší anémie
- klaustrofobie /strach z malých prostorů/
- alkoholová nebo intoxikační ebrieta
- těhotenství, kojení

Relativní kontraindikace:

- akutní exacerbace /zhoršení/ chronické bronchitidy /záněty průdušek/
- ataka /časté záchvaty/ astma bronchiale, status astmaticsus
- srdeční arytmie a chlopenní vady / nepravidelnost srdeční/, implantovaný kardiostimulátor
- ischemická choroba srdeční se syndromem anginy pectoris
- věk nad 75 let
- hypotyreóza /snížená funkce štítné žlázy/
- maligní onemocnění /nádorové onemocnění/
- nádory mozku a mozkových plen, stavy po jejich operacích
- Raynaudův syndrom /zvýšená reakce na chlad na končetinách – blednutí prstů v chladnu/
- Vertigo /závratě/
- Menses
- Pacient na antikoagulační léčbě

Vstup do kabiny možný maximálně při TK 150/95